

# Apollo<sup>®</sup> 50 SC

**Kontaktni akaricid za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka u nasadima jabuka, krušaka i vinove loze te ličinki crvenog pauka na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu**

**Aktivna tvar:** klofentezin, 500 g/l

**Formulacija:** tekući koncentrat za suspenziju - SC

## Djelovanje i primjena:

**Apollo 50 SC** je selektivan akaricid namijenjen je za suzbijanje:

- **zimskih jaja crvenog voćnog pauka** (*Panonychus ulmi*) **u nasadima jabuka i krušaka** u koncentraciji 0,04% uz utrošak najmanje 1500 l/ha škropiva (60 g u 150 l vode na 1000 m<sup>2</sup>)  
Tretirati treba u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja.  
Za suzbijanje ljetnih jaja i i mladih pokretnih razvojnih oblika pauka u koncentraciji 0,06% uz utrošak od najmanje 1500 l/ha škropiva (90 g u 150 l vode na 1000 m<sup>2</sup>).  
Tretiranje treba obaviti kada se na listu nalaze najviše 2-3 pokretna mlada razvojna oblika pauka. Može se najviše dva puta tretirati godišnje.
- **zimskih jaja crvenog voćnog pauka** (*Panonychus ulmi*) **u nasadima vinove loze** u koncentraciji 0,04% uz utrošak najmanje 1000 l/ha škropiva (40 g u 100 l vode na 1000 m<sup>2</sup>)  
Tretirati treba u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja.
- **crvenog pauka** (*Tetranychus* spp.) **na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu**  
Tretirati treba kada se pojave prvi mladi razvojni pokretni oblici paukova uz najviše dva tretiranja u vegetaciji u razmacima od najmanje 14 dana.

## Prednosti:

**Apollo 50 SC** je selektivan i učinkovit akaricid koji suzbija zimska jaja i rane pokretne stadije crvenog voćnog pauka te rane pokretne stadije crvenog pauka uz minimalan rizik za predatore: grabežljive grinje i grabežljive insekte te pčele, ako se koristi prema uputama za upotrebu.

## Ograničenja:

Sredstvo se smije koristiti najviše jedan puta godišnje u jagodama prije početka cvatnje i na šljivama za suzbijanje zimskih jaja. Ne smije se koristiti u krastavcima za kiseljenje. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

## Karenca:

7 dana za saladni krastavac (u polju i zaštićenom prostoru), 42 dana za jabuke i kruške. Na vinovoj lozi i jagodama je osigurana vremenom primjene.

**Razvrstan** je u III. skupinu otrova.