

Folpan[®] 80 WDG

Fungicid širokog spektra djelovanja

Suzbija glavne bolesti vinove loze, jabuke, kruške, koštičavog voća, maline, kupine, jagode, lubenice, dinje, krumpira, ukrasnog bilja te se koristi i u industrijske svrhe.

Aktivna tvar: folpet, 80 %

Formulacija: močive samodispergirajuće valjkaste granule - koncentrat za suspenziju

Djelovanje i primjena:

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na:

- **vinovoj lozi** za suzbijanje **plamenjače vinove loze** (*Plasmopara viticola*) i **sive plijesni** (*Botrytis cinerea*)
- **jabuci** za suzbijanje **pjegavosti lista i krastavosti plodova** (*Venturia inaequalis*)

Doze primjene:

- na vinovoj lozi za suzbijanje plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,15-0,2 % te za suzbijanje sive plijesni (*Botrytis cinerea*) u koncentraciji 0,2 % (150-200 g u 100 litara vode)
- na jabuci u koncentraciji 0,2 % (20 g u 10 litara vode)

Prednosti:

- **Folpan 80 WDG** uspješno suzbija najštetnije bolesti u vinogradima, voćnjacima i uzgajalištima cvijeca.
- **Folpan 80 WDG** je posebno pogodan za suzbijanje bolesti u vinogradima.
- **Folpan 80 WDG** se koristi širom svijeta, sam ili u kombinaciji s drugim fungicidima.
- **Folpan 80 WDG** je kompatibilan sa sistemičnim fungicidima s kojima u kombinaciji ima širi spektar djelovanja, a do rezistentnosti dolazi mnogo teže nego kada se sistemici koriste sami.
- **Folpan 80 WDG** se koristi već više od 30 godina i do sada još nije uočena rezistentnost.
- **Folpan 80 WDG** se također koristi za tretiranje sjemena i gomolja, kao dezinficijens tla u rasadnicima, a koristi se i kao zaštita prilikom pakiranja citrusa i ostalog voća.
- **Folpan 80 WDG** nije fitotoksičan. Ima malu otrovnost za sisavce, a za pčele i ostale korisne insekte nije otrovan.

U svijetu se još koristi za suzbijanje sljedećih bolesti:

- crna pjegavost (*Phomopsis viticola*) - vinova loza
- krastavost plodova (*Venturia inaequalis*) - kruška
- alternarija (*Alternaria* spp.) - jabuka, kruška
- kovrčavost lišća breskve (*Taphrina deformans*) - koštičavo voće
- gorka trulež plodova (*Gleosporium fructigenum*) - koštičavo voće
- siva plijesan (*Botrytis cinerea*) - jagoda
- plamenjača krumpira i rajčice (*Phytophthora infestans*)
- koncentrična pjegavost lišća krumpira i rajčice (*Alternaria solani*)
- polijeganje rasada (*Rhizoctonia* spp.) - ukrasno bilje
- polijeganje rasada (*Phytilium* spp.) - ukrasno bilje
- palež - fuzarioze (*Fusarium oxysporum*) - ukrasno bilje
- siva plijesan (*Botrytis cinerea*) - malina, kupina
- pepelnica (*Uncinula necator*) - vinova loza

Karenca: 21 dan za jabuku, 35 dana za stolne sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.