

# Glyphogan® 480 SL

Neselektivni sistemski herbicid širokog spektra djelovanja za suzbijanje nepoželjne vegetacije na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim zemljištima

**Aktivna tvar:** glifosat (u obliku izopropilamino soli), 480 g/l

**Formulacija:** tekući koncentratirani otopinu - SL

## Djelovanje i primjena:

**Glyphogan 480 SL** se koristi za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenjem te jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova:

- u voćnjacima i vinogradima visokih uzgojnih oblika
- na strništima
- u šumskim rasadnicima
- u kanalima (bez vode ili privremeno plavljeni)
- u močvarama (koje se kultiviraju)
- na neobrađenim površinama
- za suzbijanje izdanaka i izbojaka listača i poslije čiste sječe šuma
- na nepoljoprivrednim površinama (ceste; željezničke pruge; industrijske, rekreacijske, javne površine i dr.)

**Glyphogan 480 SL** biljke upijaju preko zelenih dijelova lišća i stabljike. Nakon ulaska u biljku **Glyphogan 480 SL** se kreće biljnim sokovima u sve dijelove biljke što kod višegodišnjih korova traje 4-6 dana. Prvi simptomi obično su vidljivi nakon 7-14 dana. Lišće na biljkama prvo uvene i požuti, a ubrzo nakon toga potamni i osuši se.

**Glyphogan 480 SL** se koristi kad su korovi visine 15-40 cm uz utrošak vode od 200-600 l/ha, a vrlo dobro djeluje kad se prska sa smanjenom količinom vode (100-200 l/ha).

**Glyphogan 480 SL** se mora prskati po mirnom vremenu (bez vjetra) kako bi se spriječilo zanošenje preparata na usjeve koji nisu cilj tretiranja. Za dobro djelovanje poželjno je da 6 sati iza prskanja ne padne kiša.

## Doze primjene:

- za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova koristi se 2-4 l/ha (200-400 ml/1000 m<sup>2</sup>)
- za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova koristi se 4-12 l/ha (400-1200 ml/1000 m<sup>2</sup>)

## Doze za najčešće vrste korova:

- za suzbijanje **pirike** 4 l/ha (400 ml/1000 m<sup>2</sup>)
- za suzbijanje **divljeg sirka, poljskog osjaka, kudrave kiselice, konjskog štavelja, divljeg pelina, maslačka i bazjana** 4-5 l/ha (400-500 ml/1000 m<sup>2</sup>)
- za suzbijanje **kupine, poljskog slaka i okruglog šilja** 6-8 l/ha (600-800 ml/1000 m<sup>2</sup>)
- za suzbijanje **zubače** 8-10 l/ha (800-1000 ml/1000 m<sup>2</sup>)

Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Sredstvo djeluje isključivo na iznikle, zelene dijelove biljaka. Ne djeluje na sjeme u tlu i preko stare kore drveća. Ne smije se koristiti u mladim voćnjacima i vinogradima sve dok je kora zelena. Ne smije se koristiti u breskvama niskog uzgoja, a ne preporučuje se koristiti niti u nasadima kupina, malina i drugog sitnog jagodičastog voća.

**Karenca:** 35 dana za voćke i vinovu lozu.

Osigurana je vremenom primjene sredstva kod predstjetvenog suzbijanja korova.

Na površinama na kojima je primijenjeno sredstvo zabranjena je ispaša mliječnih i domaćih životinja. Posušeni korovi s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se koristiti za ishranu mliječnih domaćih životinja. Ispaša i košnja za ostalu stoku dopuštena je 7 dana nakon primjene sredstva.

35 dana za nasade. Nakon tretiranja kanala voda se može koristiti za zalijevanje nakon 35 dana.

**Razvrstan** je u III. skupinu otrova.