

Goltix® WG 70

Selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih monokotiledona u šećernoj repi

Aktivna tvar: metamitron, 700 g/l

Formulacija: močive samodispergirajuće granule-koncentrat za suspenziju - WG

Djelovanje, primjena i doze primjene:

Goltix WG 70 djeluje preko korijena i preko lista i može se primjeniti u šećernoj repi u svakom njenom razvojnom stadiju te na repu nema depresivno djelovanje, a ima produženo djelovanje na ljetni spektar korova.

Goltix WG 70 je selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova (osim ljepljive bročike (*Galium aparine*), slatkastog dvornika (*Polygonum convolvulus*), jednogodišnje resulje (*Mercurialis annua*) i nekih jednogodišnjih monokotiledona (jednogodišnje vlasnjače (*Poa annua*) i obične slakoperke (*Apera spica-venti*)) u **šećernoj repi**:

- a) jednokratnom primjenom** u dozi 5-7 kg/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha (500-700 g u 10-40 l vode na 1000 m²) poslije sjetve, a prije nicanja šećerne repe ili poslije nicanja šećerne repe kada repa ima 2 prava lista, a korovi su u fazi 2-3 lista uz dodatak 3-5 l/ha (300-500 ml na 1000 m²) herbicidnog mineralnog ulja
- b) razdvojenom (split) aplikacijom** u dva ili tri navrata:
- prvo tretiranje je nakon sjetve, a prije nicanja šećerne repe u dozi 3-4 kg/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha (300-400 g u 10-40 l vode na 1000 m²)
 - ukoliko se koristi u dva navrata, drugo tretiranje je kada šećerna repa razvije prvi par listova ponovno u dozi 3-4 kg/ha (300-400 g u 10-40 l vode na 1000 m²)
 - ukoliko se koristi u tri navrata, drugi i treći puta se primjenjuje u jednakim dozama od po 1,5-2 kg/ha (150-200 g u 10-40 l vode na 1000 m²) u razmaku 5-10 dana
- Ukupna doza sredstva primijenjenog u dva ili tri navrata ne smije prijeći 8 kg/ha (800 g na 1000 m²).

Dobar učinak suzbijanja postiže se ako su korovi u razvojnoj fazi kotiledona.

U manjim dozama primjenjuje se prije nicanja repe na lakšim i humusom siromašnijim tlima i nakon nicanja kada su usjev i korovi u ranijim razvojnim fazama.

Za suzbijanje velikog dvornika (*Polygonum persicaria*) i lobode (*Chenopodium* spp.) može se nakon nicanja repe koristiti u kombinaciji s herbicidima na osnovi *fenmedifama*, *desmedifama* i *lili etofumesata*. Radi suzbijanja travnih korova može se koristiti u kombinaciji s nekim od graminicida čija je primjena dopuštena u šećernoj repi.

Karenca: osigurana je vremenom primjene u šećernoj repi.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.