

# Goltix<sup>®</sup> WG 90

Selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih monokotiledona u šećernoj i stočnoj repi

Aktivna tvar: metamitron, 900 g/l

Formulacija: moćive samodispergirajuće granule-koncentrat za suspenziju - WG

Djelovanje i primjena:

Goltix WG 90 je selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova (osim ljepljive broćike (*Galium aparine*), slatkastog dvornika (*Polygonum convolvulus*), jednogodišnje resulje (*Mercurialis annua*)) i nekih jednogodišnjih monokotiledona (jednogodišnje vlasnjače (*Poa annua*) i obične slakoperke (*Apera spica-venti*)) u šećernoj i stočnoj repi:

a) 1. nakon sjetve prije nicanja na:

- lakšim tlima u količini 1,5 kg/ha (150 g sredstva u 20-40 l vode/1000 m<sup>2</sup>)
- srednje teškim i teškim tlima u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g sredstva u 20-40 l vode/1000 m<sup>2</sup>)

2. nakon nicanja šećerne i stočne repe kada razvije prvi par listova dok su korovi u fenofazi kotiledona u količini 1,5 kg/ha (150 g sredstva u 20-40 l vode/1000 m<sup>2</sup>)

3. 10-14 dana kasnije protiv nicajućih korova u fenofazi kotiledona s 1,5 kg/ha (150 g sredstva u 20-40 l vode/1000 m<sup>2</sup>)

U tretmanima nakon nicanja dodaje se 3-5 l/ha mineralnog ulja (300-500 ml/1000 m<sup>2</sup>).

b) nakon nicanja kada repa ima repa ima razvijena 2 prava lista i kada je većina korova u fazi kotiledona

Goltix WG 90 primjenjuje se u kombinacijama u svrhu proširenja spektra i povećanja učinka suzbijanja na lobodu (*Chenopodium* spp.) i velikog dvornika (*Polygonum persicaria*)

Primjenjuje se 2-3 puta (treći put prema potrebi kada su kasnonicajućih korovi u fazi kotiledona) Goltix WG 90 u količini 1-1,5 kg/ha + 1,25 l/ha sredstva na bazi a.t. dezmedifam + 0,5 l/ha herbicidnog ulja uz utrošak 200-300 l/ha vode. U manjim dozama koristi se prije nicanja repe, na lakšim i humusom siromašnijim tlima te nakon nicanja kada su usjev i korovi u ranijim razvojnim fazama. Ako se u kombinacijama koriste herbicidi koji sadrže herbicidna ulja tada se ne smiju dodavati herbicidna ulja.

Ograničenja:

Na istoj površini smije se upotrijebiti u razdvojenoj primjeni do tri puta. Primjena iz aviona nije dozvoljena. Ukupna količina sredstva primijenjenog u dva ili tri navrata ne smije preći 5 kg/ha (500 g/1000 m<sup>2</sup>).

Ograničenja plodoreda:

Posljednji puta smije se primijeniti do kraja svibnja kako bi se u sušnim godinama izbjeglo ograničenje plodoreda.

Mogućnost miješanja: Ne smije se miješati s tekućim gnojivima.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.