

2009

DANON

herbicidi

# Legato Plus®

**Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu**

**Aktivne tvari:** *izoproturon*, 500 g/l + *diflufenikan*, 100 g/l

**Formulacija:** tekuća koncentratirana suspenzija - SC

## Djelovanje:

**Legato Plus** je kombinirani herbicid za suzbijanje sljedećih jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u mekim sortama ozime pšenice i ozimom ječmu bez podusjeva:

### • jednogodišnji travni korovi:

*Apera spica-venti* (obična slakoperka), *Poa trivialis* (obična vlasnjača), *Alopecurus myosuroides* (poljski repak), *Lolium* spp. (ljljevi)

### • širokolisni korovi:

*Anthemis arvensis* (poljski jarmen), *Capsella bursa pastoris* (obična rusomača), *Centaurea cyanus* (modri različak), *Chenopodium album* (obična loboda), *Galium aparine* (čekinjasta broćika), *Lamium purpureum* (grimizna mrtva kopriva), *Matricaria chamomilla* (prava kamilica), *Myosotis arvensis* (poljska potočnica), *Papaver rhoeas* (mak), *Polygonum* spp. (dvornici), ***Ranunculus arvensis* (poljski žabnjak)**, ***Raphanus raphanistrum* (divlja rotkva)**, ***Sinapis arvensis* (poljska gorušica)**, *Stellaria media* (mišjakinja), *Thlaspi arvense* (poljska čestika), *Veronica* spp. (čestoslavica), *Viola* spp. (ljubica)

## Primjena:

**Legato Plus** se primjenjuje u dozi 1,25-1,75 l/ha (125-175 ml na 1000 m<sup>2</sup>) uz utrošak vode od 300 l/ha (30 l na 1000 m<sup>2</sup>). Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rano nakon nicanja u jesen ili u proljeće kada usjev razvije do 3 lista (do fenofaze 13 po ZCK skali).

## Ograničenja:

Smije se primjeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Ne koristiti sredstvo na kosim erozivnim površinama. Ne smije se koristiti na dreniranim površinama, na lakim pješčanim tlima, ali i na tlima koja u površinskom sloju sadrže više od 20 % glinastih čestica da se smanji visoka ispirljivost IPU. Na izrazito kiselim tlima (pH ispod 5) usporena je razgradnja. Spriječiti zanošenje škropiva.

## Fitotoksičnost:

Ako se **Legato Plus** primjenjuje prema uputama neće doći do fitotoksičnosti. U uvjetima obilnijih oborina, nakon primjene se na usjevu pojavljuju simptomi prolazne kloroze na donjim listovima. Ne smije se koristiti poslije nicanja na smrznutom usjevu niti kada se očekuju dugotrajni mrazevi. Ne smije se primjenjivati na usjevima koji su oštećeni ili oslabljeni uslijed biljnih bolesti, štetnika, mrazeva ili zbog stagniranja vode. Prije sjetve postrih usjeva (kukuruz, krumpir, kupusnjače i dr.) tlo treba obavezno dublje preorati (najmanje 25 cm).

## Karenca:

Osigurana je dopuštenim vremenom i načinom primjene sredstva.

**Razvrstan** je u III. skupinu otrova.