

# Leopard® 5 EC

**Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru**

**Aktivna tvar:** kizalofop-p-etil, 50 g/l

**Formulacija:** tekući koncentratirani za emulziju - EC

## Djelovanje i primjena:

**Leopard 5 EC** se koristi kao herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru. Tretiranje treba obaviti poslije nicanja usjeva i travnih korova u vrijeme kada razvijaju 3-6 listova.

## Doze primjene:

### Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova:

U količini 0,8-1,5 l/ha ovisno o razvojnoj fazi korova (80-150 ml proizvoda u 20-40 l vode na 1000 m<sup>2</sup>)

- 0,8 l/ha kada je većina korova u fenofazi 3 lista,
- 1,0 l/ha kada je većina korova u fenofazi 4-5 listova,
- 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova.

### Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova:

U količini 1,5-3,0 l/ha ovisno o vrsti i razvojnoj fazi korova (150-300 ml proizvoda na 1000 m<sup>2</sup>)

- 1,5-2,0 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (*Sorghum halepense*) u fenofazi 3-6 listova,
- 2,0-2,5 l/ha za suzbijanje pirike (*Agropyron repens*) kada je dostigla 10-20 cm visine,
- 2,5-3,0 l/ha za suzbijanje zubače (*Cynodon dactylon*) kada je dostigla 25-30 cm visine.

Može se koristiti i u dvije polovične količine.

Za prskanje se koristi leđna ili traktorska tlačna prikolica, tlak 1-3 bara, protok 0,3-0,5 lit/min.

Kod primjene u šećernoj repi smije se miješati sa preparatima na bazi fenmedifama i kloridazona.

## Ograničenja:

Ne smije se koristiti u mladom i sjemenskom krumpiru.

Soja i ostale uljarice smiju se tretirati samo prije početka cvatnje s tim da se može samo jednom godišnje primijeniti u punoj dozi.

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Razmak između primjene **Leoparda 5 EC** i herbicida za suzbijanje širokolisnih korova mora biti najmanje 3 dana, u suprotnom se smanjuje učinak.

Ne koristiti iznad 2,5 l/ha u krumpiru radi opadanja selektivnosti.

**Karenca:** 77 dana za krumpir, soju i šećernu repu, a u suncokretu i uljanoj repici osigurana je dozvoljenim vremenom primjene.

**Razvrstan** je u III skupinu otrova.