

2009

DANON

herbicidi

# Galigan® 240 EC

**Zemljišni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih višegodišnjih korova u kupusu, suncokretu, luku, voćnjacima i vinogradima**

**Aktivna tvar:** oksifluorfen, 240 g/l

**Formulacija:** tekući koncentratirani za emulziju - EC

## Djelovanje i primjena:

**Galigan 240 EC** je zemljišni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: loboda (*Chenopodium* sp.), hrapavog šćira (*Amaranthus retroflexus*), svinjaka (*Sonchus* sp.), kostriša (*Senecio* sp.), običnog kužnjaka (*Datura stramonium*), velikog dvornika (*Polygonum persicaria*), čestoslavica (*Veronica* sp.), konica (*Galinsoga* sp.), tuštova (*Portulaca* sp.), divlje rotkve (*Raphanus raphanistrum*), cecelja (*Oxalis* sp.) i dr., pri čemu kod primjene nakon nicanja, u višoj preporučenoj dozi, suzbija i neke višegodišnje korove: zubaču (*Cynodon dactylon*) i slakove (*Convolvulus* sp.).

Primjenjuje se u:

- **kupusu** u dozi 1,5-2,5 l/ha (150-250 ml na 1 000 m<sup>2</sup>), primjenom prije presađivanja kupusa uz utrošak od najmanje 300 l/ha vode
- **suncokretu** primjenom poslije sjetve, a prije nicanja usjeva, u dozi 1-1,25 l/ha (100-125 ml na 1 000 m<sup>2</sup>), ako prevladavaju širokolisni korovi, ili u kombinaciji s nekim od graminicidnih herbicida i to npr.: **Galigan 240 EC** u dozi od 1 l/ha (100 ml na 1 000 m<sup>2</sup>) + herbicid na bazi a.t. *trifluralin* (48% a.t.), u dozi od 2 l/ha (200 ml na 1 000 m<sup>2</sup>). Sredstvo na bazi *trifluralina* mora se obavezno unijeti u tlo prije sjetve, a naknadna obrada tla nije dopuštena.
- **vinogradu** tijekom dormantnog perioda za suzbijanje sjemenskih širokolisnih i uskolisnih korova u dozi od 3-4 l/ha uz utrošak 300-500 l vode/ha. Može se primijeniti i u mladom vinogradu starijem od jedne godine
- **luku**
  - a) iz sjemena,
    - *jednokratno*: 1 l/ha (10 ml na 100 m<sup>2</sup>) u fazi 2 lista ili 1,5 l/ha (15 ml na 100 m<sup>2</sup>) u fazi 3-4 lista;
    - *dvokratno*: 0,5 l/ha u fazi 2 lista i 10-15 dana kasnije ili 0,75 l/ha u fazi 3 lista i 10-15 dana kasnije ili 0,2 l/ha u dvije razdvojene primjene počevši od prvog pravog lista;
    - *trokratno*: 0,1 l/ha u fazi prvog pravog lista te još dva puta po 0,2 l/ha u razmaku od 7-10 dana iza svake primjene;
  - b) iz lučica nakon sadnje, a prije nicanja 0,8-1,2 l/ha
  - c) iz lučica i presadnica ukupno u količini 1,5 l/ha primjenom u razdvojenoj aplikaciji u dva ili tri roka primjene. Presadnice tretirati kad se "prime", tj. nakon razvoja barem dva prava lista. Najbolji učinak postiže se u ranijoj fazi razvoja korova s razmakom tretiranja od 10-15 dana. Ne koristiti u proizvodnji mladog luka za salatu. Smije se primijeniti jedanput godišnje (u punoj dozi) na istoj površini. Ne koristiti u zaštićenom prostoru i u nasadu oslabljenom od stresa ili jače oštećenom od bolesti i štetnika. Primjena iz aviona nije dozvoljena.

**Karenca:** 42 dana za kupus i luk. U suncokretu i nasadima vinograda je osigurana vremenom primjene sredstva.

**Razvrstan** je u III. skupinu otrova.

sredstva za zaštitu bilja

5