

# Goltix® WP 70

**Selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih monokotiledona u šećernoj repi**

**Aktivna tvar:** metamitron, 700 g/l

**Formulacija:** močivi prah-koncentrat za suspenziju - WP

## Djelovanje, primjena i doze primjene:

**Goltix WP 70** je selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova (osim ljepljive bročike (*Galium aparine*), slatkastog dvornika (*Polygonum convolvulus*), jednogodišnje resulje (*Mercurialis annua*) i nekih jednogodišnjih monokotiledona: jednogodišnje vlasnjače (*Poa annua*) i obične slakoperke (*Apera spica-venti*) **u šećernoj repi:**

### a) razdvojenom (split) aplikacijom u dva ili tri navrata:

- prvo put nakon sjetve, a prije nicanja šećerne repe u količini 3-4 kg/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha (300-400 g u 10-40 l vode na 1000 m<sup>2</sup>)
- ukoliko se koristi u dva navrata, drugi put se primjenjuje kada šećerna repa razvije prvi par listova ponovno u količini 3-4 kg/ha (300-400 g u 10-40 l vode na 1000 m<sup>2</sup>)
- ukoliko se koristi u tri navrata, drugi i treći put primjenjuje se u jednakim količinama od 1,5-2 kg/ha (150-200 g u 10-40 l vode na 1000 m<sup>2</sup>) u razmaku 5-10 dana

Ukupna količina sredstva primijenjenog u dva ili tri navrata ne smije prijeći 8 kg/ha (800 g/1000 m<sup>2</sup>).

Dobar učinak suzbijanja postiže se ako su korovi u razvojnoj fazi kotiledona.

Niže doze primjenjuju se prije nicanja repe na lakšim i humusom siromašnijim tlima i nakon nicanja kada su usjev i korovi u ranijim razvojnim fenofazama.

Za suzbijanje velikog dvornika (*Polygonum persicaria*) i lobode (*Chenopodium* spp.) može se nakon nicanja repe koristiti u kombinaciji s herbicidima na bazi *fenmedifama*, *desmedifama* i/ili *etofumesata*. Radi suzbijanja travnih korova može se koristiti u kombinaciji s nekim od graminicida čija je primjena dopuštena u šećernoj repi.

**b) jednokratnom primjenom** u količini 5-7 kg/ha uz utrošak 100-400 l/ha vode (500-700 g u 10-40 l vode na 1000 m<sup>2</sup>) i to poslije sjetve, a prije nicanja šećerne repe ili poslije nicanja šećerne repe kada repa ima 2 prava lista, a korovi su u fazi 2-3 lista uz dodatak 3-5 l/ha (300-500 ml/1000 m<sup>2</sup>) herbicidnog mineralnog ulja.

**Goltix WP 70** djeluje preko korijena i lista. Može se primijeniti u šećernoj repi u svakom njenom razvojnom stadiju te na repu nema depresivno djelovanje. Ima produženo djelovanje na ljetni spektar korova.

**Karenca:** Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene u šećernoj repi.

**Razvrstan** je u III. skupinu otrova.