

Nimrod[®] 25 EC

Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje pepelnica na jabukama, krastavcima, lubenicama i dinjama.

Inhibitor biosinteze adenozina - iskazuje jaki antisporulantni učinak.

Aktivna tvar: bupirimat, 250 g/l

Formulacija: tekući koncentrat za emulziju - EC

Djelovanje, primjena i doze primjene:

Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje:

- **pepelnice** (*Podospheera leucotricha*) **na jabukama** na sortama osjetljivim na pepelnicu (Golden delicious i dr.) u koncentraciji 0,04-0,05 % u razmacima 7-14 dana
Zbog moguće fitotoksičnosti ne preporuča se za sorte Jonathan, Cox orange, Morgenduft i Imperatore.
- **pepelnice** (*Erysiphe cichoracearum*) **na krastavcima, lubenicama i dinjama** u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 ml u 10 l vode ili 40-50 ml u 100 l vode) u razmacima 7-14 dana

Za prskanje se koristi ledna ili traktorska tlačna prskalica: tlak 1-3 bara, protok 0,3-0,5 lit/min.

Utjecaj na korisne organizme:

U primjeni **Nimrod 25 EC** nije opasan za: pčele, gujavice i predatore: *Ptereostichus cupreus*, *Chrysoperla carnea*, *Aphidius rhopalosiphi*. Djelomično oštećuje populaciju *Typhlodromus pyri*. Oštećuje populaciju *Encharsia formosa*. Ne oštećuje C-N-mikrobiološku aktivnost tla.

Ograničenja:

Ne preporuča se miješanje s ditiokarbamatnim fungicidima (mankozeb, propineb, metiram), bakrenim fungicidima, fosetilom, propamokarbom, svim lužnatim preparatima i dodinom. Ne smiju se dodavati okvašivači.

Ne tretirati na otvoren cvijet. Ne koristiti preparat kod biljaka oslabljenih od suše.

Može se koristiti najviše 4 puta tijekom vegetacije jabuka i 6 puta na krastavcima.

Primjena iz aviona nije dozvoljena.

Karenca: 21 dan za jabuke; 7 dana za krastavce, lubenice i dinje.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.