



**zaštita
breskve i
marelice**

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
u proljeće	GLYPHOGAN 480 SL + GALIGAN 240 EC	1% + 0,3-0,4 l/ha u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN 480 SL	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5-2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20 30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Uoči cvatnje i nakon cvatnje Nakon bubrenja pupova Nakon berbe Neposredno prije cvatnje U punoj cvatnji	MERPAN 80 WDG	0,2 % 2-3 kg/ha	Šupljikavost lista koštičavih voćaka Kovrčavost lista breskve* Monilia*
Uoči cvatnje i nakon cvatnje Nakon bubrenja pupova Nakon berbe Neposredno prije cvatnje U punoj cvatnji	FOLPAN 80 WDG	0,2 % 1,5-2 kg/ha	Šupljikavost lista koštičavih voćaka Kovrčavost lista breskve
Završetak cvatnje	BUMPER 25 EC*	0,4 l/ha	pepelnica
INSEKTICIDI			
Prije cvatnje, cvatnja	MAVRIK 2 F	0,3 l/ha	Breskvin savijač, lisne uši
10-15 dana iza cvatnje	PYRINEX 250 ME*	2 l/ha	Breskvin savijač
10-15 dana iza cvatnje Nakon pojave	KOHINOR 200 SL	0,025 % 0,025 - 0,05 % 0,5 l/ha	Lisne uši - Breskvina zelena uš Štitaste uši Breskvin savijač* Trips - nektarine*
Svibanj, lipanj	LAMDEX 5 EC	0,02 %	Breskvin savijač, breskvin moljac Lisne uši*
Svibanj, lipanj	RIMON 10 EC	0,04 - 0,05 % 0,5 l/ha	Breskvin savijač, breskvin moljac
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima