


2009

DANON

program zaštite

	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
 <p><b>zaštita dinje i lubenice</b></p>	<b>HERBICIDI</b>			
	Prije sadnje	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 - 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5-2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	<b>INSEKTICIDI</b>			
	Prije presađivanja	PYRINEX 48 EC	6 -8 l/ha širom 0,4 l/ 1000 dm	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovcii, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
	Kod pojave prvih mladih razvojnih pokretnih oblika, 2 puta u razmacima min. 14 dana	APOLLO 50 SC*	0,04 %	Koprivin crveni pauk
	Potapanje presadnica U vegetaciji kod pojave štetnika	KOHINOR 200 SL*	0,35 % 0,5 -1 l/ha 1- 1,5 l/ha	Žičnjaci, lisne uši, tripsi Lisne uši tripsi, štitaši moljci, stjenice
	U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC*	0,1 -0,15 l/ ha 0,2 -0,3 l/ha	Lisne uši, lisni mineri, bijela mušica, stjenice, resičari, lisne sovice Štitaši moljac
	<b>FUNGICIDI</b>			
	Zalijevanje klijališta - Prije ili poslije nicanja, ponoviti prskanje po potrebi	MERPAN 80 WDG	0,2 % u 3-4 vode l/m <sup>2</sup>	Bolesti polijeganja rasada (Pythium, Phytophthora)
Preventivno u fazi pojave prvih listova, svakih 10-14 dana	FOLPAN 80 WDG* ILI MERPAN 80 WDG*	0,13 % 0,15 %	Plamenjača	
Kod pojave prvih simptoma, u razmacima 7-14 dana	NIMROD 25 EC	0,04 - 0,05%	Pepelnica dinje i lubenice	
<b>OSTALO</b>				
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima	