



**zaštita  
jabuke**

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili	NAPOMENA
<b>HERBICIDI</b>			
u proljeće	GLYPHOGAN 480 SL + GALIGAN 240 EC	1% + 0,3-0,4 l/ha u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN 480 SL	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta do početka cvatnje korova	TOMIGAN 250 EC	1,5-2 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ILJ LEOPARD 5 EC	0,5-2 l/ha  0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20 30 cm) travni korovi
<b>FUNGICIDI</b>			
Prije cvatnje - od faze ružičastog pupa. Kasniji stadiji vegetacije - nakon cvatnje.	MERPAN 80 WDG	0,2 % 2-3 kg/ha	Krastavost jabuke  Trulež plodova - monilia
Prije cvatnje - od faze ružičastog pupa Kasniji stadiji vegetacije - nakon cvatnje	FOLPAN 80 WDG	0,15 - 0,2% 2 kg/ha	Krastavost jabuke
Početak cvatnje	BUMPER 25 EC *	0,4 l/ha	Pepelnica jabuke
Nakon cvatnje -tijekom ljeta	NIMROD 25 EC	0,04 - 0,05% 0,8 l/ha	Pepelnica jabuke
<b>INSEKTICIDI</b>			
Prije cvatnje i nadalje	MAVRIK 2 F	0,02 - 0,04 % 0,2 - 0,25 l/ha	Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš
Nakon cvatnje	RIMON 10 EC	0,04 - 0,05 % 0,5 l/ha	Jabučni savijač, miner okruglih mina, savijači kože ploda Kukuruzni moljac *, sovice *, sivi savijač pupova *
Tijekom ljeta			
Mine veličine 1-2 mm Lipanj, kolovoz(do početka cvatnje) U vrijeme pojave mobilnih stadija Početak lipnja, sredina srpnja Plodovi veličine lješnjaka, nakon 30 dana Kraj cvatnje	KOHINOR 200 SL	0,0375 - 0,05 % 0,025 % 0,05 %  0,5 l/ha	Miner okruglih mina Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš Jabučna krvava uš - nije dovoljno efikasan Kalifornijska šteta uš Jabučni savijač, savijač kože ploda Jabučna osica *
Nakon cvatnje Tijekom ljeta	PYRINEX 250 ME	0,2 - 0,3 % 2 l/ha	Jabučni savijač, savijač kože ploda Kukuruzni moljac *, sovice *, sivi savijač pupova *
Nakon cvatnje Tijekom ljeta Prije cvatnje	LAMDEX 5 EC	0,01 - 0,015 %	Jabučni savijač, jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš, miner okruglih mina Kukuruzni moljac * Jabučna osica *, cvjetojed *
Prvo tretiranje nakon cvatnje Nakon izlaska ličinki iz zimskih jaja	APOLLO 50 SC	0,04 % 0,06 % 0,8 l/ha	Zimska jaja crvenog voćnog pauka Ljetni oblici
<b>OSTALO</b>			
	NU-FILM-17 *	0,025-0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škopivima