

2009

DANON

program zaštite



zaštita krastavca

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije sadnje	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 - 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI	0,5-2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	LEOPARD 5 EC	0,8- 3 l/ha	
INSEKTICIDI			
Prije presađivanja	PYRINEX 48 EC	6 -8 l/ha širom 0,4 l/ 1000 dm	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno nošenje u tlo
Kod pojave prvih mladih razvojnih pokretnih oblika, 2 puta u razmacima min. 14 dana	APOLLO 50 SC	0,04 %	Koprivin crveni pauk
U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC	0,1 -0,15 l/ha	Lisne uši, resičari, lisne sovice, lisni mineri*, bijela mušica*, stjenice* Štitasti moljac*
		0,2 -0,3 l/ha	
Potapanje presadnica U vegetaciji kod pojave štetnika	KOHINOR 200 SL*	0,35 % 0,5 -1 l/ha 1- 1,5 l/ha	Žičnjaci, lisne uši, tripsi Lisne uši tripsi, štitasti moljci, stjenice
FUNGICIDI			
Zalijevanje klijališta -Prije ili poslije nicanja, ponoviti prskanje po potrebi	MERPAN 80 WDG	0,2 % u 3-4 l vode/m ²	Bolesti polijeganja rasada (Pythium, Phytophthora)
Preventivno u fazi pojave prvih listova, svakih 10-14 dana	FOLPAN 80 WDG*	0,13 %	Plamenjača
	ILI MERPAN 80 WDG*	0,15 %	
Kod pojave prvih simptoma, u razmacima 7-14 dana	NIMROD 25 EC	0,04 - 0,005%	Pepelnica krastavaca
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropljivima