



## zaštita krumpira

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
<b>HERBICIDI</b>			
Prije sadnje	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 - 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sadnje, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	4-6 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon sadnje, prije nicanja	AFALON DISPERZIJA ILI LINUREX 50 SC	2-2,5 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sadnje, prije nicanja	RACER 25 EC	2 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sadnje, prije nicanja ili nakon nicanja kad krumpir ima 5-8 listova	MISTRAL 70 WG	0,75- 1,5 0,5 - 0,75 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sadnje, prije nicanja	MISTRAL 70 WG + PENDIGAN 330 EC	0,5 - 1,5 + 4 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sadnje, prije nicanja	MISTRAL 70 WG + RACER 25 EC	0,3-0,75 + 0,5-1,2 l/ha	Jednogodišnji širokolisni (ambrozija) i neki travni korovi
Nakon nicanja krumpira i korova	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5-2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
<b>INSEKTICIDI</b>			
Prije sadnje ili sa sadnjom	PYRINEX 48 EC	6 - 8 l/ha širom 3 l/ha u trake	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovce, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
U vegetaciji, kod pojave štetnika u kritičnom broju	KOHINOR 200 SL	0,25 - 0,5 l/ha	Krumpirova zlatica, lisne uši*
Početak izlaska ličinki zlatice iz jaja	RIMON 10 EC*	0,3 l/ha	Krumpirova zlatica
<b>FUNGICIDI</b>			
Prije pojave bolesti, preventivno na početku vegetacije do cvatnje te nakon cvatnje	SHAKAL 500 SC	0,3 - 0,4 l/ha	Plamenjača krumpira
Prije pojave bolesti, preventivno na početku vegetacije do cvatnje te nakon cvatnje	MERPAN 80 WP*	1,8 kg/ha	Plamenjača krumpira
Prije pojave bolesti, preventivno na početku vegetacije do cvatnje te nakon cvatnje	FOLPAN 80 WDG*	1,8 kg/ha	Plamenjača krumpira, alternaria
<b>OSTALO</b>			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima