

2009

DANON

program zaštite



**zaštita
kupine i
maline**

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN 480 SL	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5 - 2 l/ha 0,8 - 3 l/ha	Jednogodišnji (3 - 5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Kad su izboji dugi 30 - 35 cm Prvo tretiranje poslije cvatnje Kad su izboji dugi 15 - 20 cm (Od pojave prvih listića do početka cvatnje)	FOLPAN 80 WDG*	1,5 kg/ha	Phomopsis spp. Siva plijesan i pjegavost lista Sušenje izdanaka malina i kupina
Kretanje vegetacije Pred berbu drugo tretiranje poslije cvatnje Kad su izboji dugi 15-20 cm (Od pojave prvih listića do početka cvatnje)	MERPAN 80 WDG*	0,2 % 2 kg/ha	Siva plijesan - malina, kupina nakon berbe Trulež plodova maline - monilia Siva plijesan i pjegavost lista Sušenje izdanaka malina i kupina
Od otvaranja pupova do cvatnje	BUMPER 25 EC*	0,015 %	Žuta hrda
INSEKTICIDI			
Kad su izboji dužine 30-35 cm Prva generacija pred cvatnju Od pojave do početka cvatnje	MAVRIK 2 F*	0,4 l/ha	Koprivina i kupinova grinja, malinar Malinova mušica Malinova buba Lisne uši
Prva generacija pred cvatnju Od pojave do početka cvatnje Početak cvatnje, ponoviti za 10 dana	LAMDEX 5 EC*		Malinova mušica Malinova buba Lisne uši Cvjetojed malinar
Po potrebi	PYRINEX 250 ME*	2 l/ha	Lisne uši
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima