



## zaštita kupusnjača

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
<b>UZGOJ PRIJESADNICA</b>			
Raskuživanje tla ili supstrata u klijalištu zalijevanjem 3 - 4 l/m <sup>2</sup>	MERPAN 80 WDG	0,2%	Bolesti polijeganja rasada - Pythium, Phoma, Alternaria
Zalijevanje presadnica 5 - 10 l/m <sup>2</sup>	MERPAN 50 WP*	0,2%	Bolesti polijeganja presadnica - Pythium, Phoma, Alternaria
Namakanje prijesadnica kupusa u otopini insekticida pred presađivanje 15 minuta	KOHINOR 200 SL	0,1%	Kupusne lisne uši, lisne sovice, Buhač*, tripsi*, kupusna muha*
<b>UZGOJ U POLJU</b>			
<b>HERBICIDI</b>			
Prije presađivanja	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 - 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Prije presađivanja	GALIGAN 240 EC	1,5-2,5 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki višegodišnji korovi
Prije presađivanja	PENDIGAN	5 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5- 2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
<b>INSEKTICIDI</b>			
Prije rasađivanja	PYRINEX 48 EC	6 - 8 l/ha širom 3 l/ha u trake	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovci, hrušt, kupusna muha uz obavezno unošenje u tlo
U doba leta muhe Razvoj rozete, formiranje glave		1-1,5 l/ha	Lisne uši*, kupusna muha*, kupusni moljac* - prskanje ili zalijevanje s 0,8 l škropiva/biljci
u vegetaciji, kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC	0,15 - 0,2 l/ha 0,2-0,3 l/ha	kupusni moljac, kupusna soвица, kupusna uš, kupusni bijelac, resičari, lisne uši, kupusne stjenice*, kupusna pipa*, kupusne ciganke*, buhači Štitasti moljac
U rasadu, nakon presađivanja i u vegetaciji - 5 listova do formiranja glavice	KOHINOR 200 SL*	1 l/ha	Kupusne lisne uši, lisne sovice
Pred berbu	MAVRIK 2F*	0,3 l/ha	Lisne sovice, kupusari
5 listova do formiranja glavice	RIMON 10 EC* + MAVRIK 2F*	1 l/ha + 0,3 l/ha	Lisne sovice
<b>OSTALO</b>			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima