



zaštita
luka

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije sjetve	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Iz sjemena	GALIGAN 240 EC	1 l/ha - 2 lista 1,5 l/ha - 3-4 lista 0,5 l/ha - 2 lista i nakon 10-15 dana 0,75 l/ha - 3 lista i nakon 10-15 dana 0,1 l/ha - prvi pravi list i 2 put 0,2 l/ha u razmaku 7-10 dana	Jednogodišnji širokolisni korovi
Iz lučica nakon sadnje, prije nicanja		0,8-1,2 l/ha	
Iz lučica i presadnica		1,5 l/ha ukupno u 2-3 puta, prvi put kad presadnice imaju 2 prava lista, te nakon 10-15 dana	
Nakon sjetve ili sadnje luka iz sjemena ili lučica, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	3 - 5 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC*	0,5 - 2 l/ha 0,8 - 3 l/ha	Jednogodišnji (3 - 5 listova) i višegodišnji (20 - 30 cm) travni korovi
Luk iz lučice - korovi i luk 2-6 lista	TOMIGAN 250 EC	0,5 - 0,8 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
FUNGICIDI			
Potapanje lukovica pred sjetvu U vegetaciji prije pojave prvih simptoma bolesti 3-4 puta	MERPAN 80 WP*	2 gr/kg 2 kg/ha	Plamenjača luka
U vegetaciji, preventivno	SHAKAL 500 SC*	0,3 - 0,4 l/ha	Botrytis
INSEKTICIDI			
Prije sjetve ili sadnje U vrijeme najjačeg leta leptira prve generacije - sredinom svibnja	PYRINEX	6 - 8 l/ha širom 0,2 %	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo Lukova i češnjakova muha*, prskanje ili zalijevanje
Potapanje lukovica prije sadnje u vremenu 15 min U vegetaciji, ako lučice nisu potapane	KOHINOR 200 SL*	0,5 % 0,5 l/ha	Lukova i češnjakova muha, žičnjaci, tripsi Lukova i češnjakova muha, tripsi
U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC*	0,1 - 0,15 l/ha 0,2 - 0,3 l/ha	Resičari Štitasti moljac
Kraj porasta lisne mase	MAVRIK 2F*	0,3 l/ha	Lukova buha
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025-0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima