



zaštita paprike

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije presađivanja	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 - 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Prije presađivanja	PENDIGAN 330 EC	5 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC	0,5 - 2 l/ha 0,8 - 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
INSEKTICIDI			
Prije sadnje	PYRINEX 48 EC	6 - 8 l/ha širom	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC	0,1 - 0,15 l/ha	lisne uši, lisna soвица, bijela mušica*, mineri*, tripsi*, kukuruzni moljac*
		0,2-0,3 l/ha	Štitasti moljac
U vegetaciji kod pojave simptoma ili štetnika	KOHINOR 200 SL*	1 l/ha 0,7 l/ha	Duhanov štitasti moljac, trips Lisne uši
Nakon pojave prvih kolonija te nakon 10 dana	MAVRIK 2 F*	0,3 l/ha	Zelena breskvina uš
7 dana nakon početka leta leptira 2. generacije (lovne lampe ili trake)	RIMON 10 EC* + MAVRIK 2 F*	0,75 + 0,2 l/ha	Pamukova soвица, kukuruzni moljac
FUNGICIDI			
Zalijevanje prije ili poslije nicanja u rasadu 3-4 l škropiva po m ²	MERPAN 80 WDG	0,2 %	Bolesti polijeganja rasada (Pyhium, Phytophthora)
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima