

2009

DANON

program zaštite



zaštita šećerne repe

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije sjetve	GLYPHOGAN 480 SL	1,5 - 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja repe i korova	GOLTIX WG 70 ili GOLTIX WP 70	2 -3 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja repe - 1. post - korovi u fazi kotiledona	GOLTIX WG 70 ili GOLTIX WP 70	1,5 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja repe - 2. post - nakon 7-10 dana, repa prvi par listova	GOLTIX WG 70 ili GOLTIX WP 70	1,5 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja repe - 2. post	AGIL 100 EC ili LEOPARD 5 EC	0,5-2 l/ha 0,8- 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
INSEKTICIDI			
Prije sjetve ili sa sjetvom u vrijeme pojave	PYRINEX 48 EC	6 -8 l/ha širom 3 l/ha u trake 1,5 l/ha	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo Repina pipa*, lisne sovice*, lisne uši*, repin moljac*
u vrijeme pojave	LAMDEX 5 SC	0,1 -0,15 l/ha	Lisne sovice, sovice pozemljuše, repina pipa, repin buhač, lisne uši repin moljac
u vrijeme pojave	MAVRIK 2 F	0,2 l/ha	Lisne uši (crna repina uš)
u vrijeme pojave	KOHINOR 200 SL*	0,25 l/ha	Lisne uši
FUNGICIDI			
U vrijeme pojave prvih pjega na 5-10% biljaka i nakon 20 dana	ZAMIR*	1 l/ha	cercospora
OSTALO			
	NU-FILM-17 *	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima