

Pyrinex[®] 48 EC

Insekticid širokog spektra djelovanja

Aktivna tvar: klorpirifos, 480 g/l

Formulacija: tekući koncentrat za emulziju - EC

Djelovanje i primjena:

Zemljišni kontaktni insekticid dobrog dubinskog djelovanja za suzbijanje ličinki štetnika u tlu:

- **žičnjaka** (Elateridae)
- **hrušta** (*Melolontha melolontha*)
- **rovca** (*Gryllotalpa gryllotalpa*)
- **sovica pozemljuša** (Noctuidae)

u ratarskim usjevima (kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu) i **krumpiru** (osim mladog) i **povrću** (osim korjenastog povrća).

Doze primjene:

- po cijeloj površini (široj) u količini 6-8 l/ha (0,6-0,8 l preparata na 1000 m²; 60-80 ml preparata na 100 m²) - primjena širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada štetnika u tlu
 - u trake širine 10-15 cm u količini 3 l/ha (30 ml preparata na 100 m²; 300 ml na 1000 m²)
- Inkorporaciju (unošenje) u tlo na 5-8 cm dubine obaviti odmah nakon tretiranja.

U Europi se još koristi u:

1. ratarstvu i povrtlarstvu (kukuruz, šećerna repa, suncokret, duhan, žitarice, krumpir, paprika, kupusnjače, lukovi, ...) za suzbijanje sovetica pozemljuša (Noctuidae), lisnih uši (Aphidae), repine pipe (*Bothynoderes punctiventris*), repičinog sjajnika (*Meligethes aeneus*), rovca (*Gryllotalpa gryllotalpa*) u količini 1-1,5 l/ha
2. voćarstvu za suzbijanje lisnih uši (Aphidae), krvave uši (*Eriosoma lanigerum*), jabučnog savijača (*Cydia/Carpocapsa/pomonella*), jabučnog cvjetara (*Anthonomus pomorum*), dudovca (*Hyphantria cunea*), gubara (*Limantria dispar*), breskvinog savijača (*Cydia molesta*), šljivinog savijača (*Cydia funebrana*), cvrčaka (Cicadina) u količini 1-1,5 l/ha

Prednosti:

- Potvrđena visoka djelotvornost.
- **Pyrinex** djeluje na velik broj štetnika raznih kultura i staništa.
- **Pyrinex** je registriran širom svijeta za mnoge štetnike i na mnogim kulturama.
- **Pyrinex** je kompatibilan s većinom insekticida, fungicida i akaricida te se može primjenjivati s njima u kombinaciji.

Karenca:

42 dana kupusnjače i ostalo povrće, 63 dana luk i 91 dan krumpir. U kukuruzu, repi i suncokretu osigurana je vremenom primjene, a za lišće repe iznosi 91 dan. Ne smije se koristiti nakon 01.07. jer je razgradnja u tlu sporija zbog nedostatka vlage u tlu.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.