

# Shavit F<sup>®</sup>

**Kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi**

**Aktivne tvari:**

- *folpet*, 70 %
- *triadimenol*, 1,5 %

**Formulacija:** močivi prah-koncentrat za suspenziju - WP

**Djelovanje i primjena:**

Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na **vinovoj lozi**:

- **peronospora vinove loze** (*Plasmoparaa viticola*)
- **crna pjegavost** (*Phomopsis viticola*)
- **pepelnica** (*Uncinula necator*)

**Doza:**

- koncentracija 0,3% (300 g sredstva u 80 -100 l vode na 1000 m<sup>2</sup>)

**Ograničenja:**

U jednoj vegetaciji može se koristiti najviše tri puta.

Primjena iz aviona nije dozvoljena.

Škropivo treba nakon pripreme odmah utrošiti.

Ne smije se miješati s diklorvosom, heptenofosom, dimetoatom, vamidotionom, uljnim sredstvima, propargitom i bordoškom suspenzijom. Preporuča se provjeriti mješavina s EC sredstvima - ukoliko dođe do koagulacije ili brzog taloženja (kroz pola sata) ne smije se miješati.

**Karenca:** 35 dana za stolne sorte i 42 dana za vinske sorte vinove loze.

**Razvrstan** je u III. skupinu otrova.