

Zamir®

Kombinirani sistemski fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti

Suzbija najvažnije bolesti u pšenici i ječmu

Aktivne tvari: *prokloraz*, 267 g/l + *tebukonazol*, 133 g/l

Formulacija: tekući koncentrat za emulziju - EC

Djelovanje i upotreba:

Zamir je kombinirani fungicid iz porodice imidazola i triazola. Djeluje preventivno, kurativno i eradikativno. Inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C-14). Sprečava razvoj bolesti i kreće se translaminarno. Zahvaljujući sistemskom djelovanju djeluje na široki spektar bolesti, a registriran je za suzbijanje bolesti u sljedećim žitaricama:

a) na pšenici:

- za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (*Septoria tritici*), rđe (*Puccinia recondita*), paleži klasa (*Fusarium graminearum*) i pepelnice (*Blumeria/Erysiphe/graminis*)

b) na ječmu:

- za suzbijanje rđe (*Puccinia hordei*) i pepelnice (*Blumeria/Erysiphe/graminis*) te smanjenje zaraze sivom pjegavosti ječma (*Rhynchosporium secalis*)

U svijetu još koristi u zaštiti:

- koštičavog voća protiv monilije (*Monilia fructigena*)
- pjegavosti lista šećerne repe (*Cercospora beticola*).

Doze primjene:

Sredstvo se za sve namjene primjenjuje u količini od 1,2 l/ha (120 ml sredstva na 1000 m²).

Ograničenja:

Dopuštena su najviše dva tretiranja u vegetaciji. Primjena iz aviona je iznimno dopuštena samo na velikim površinama pod uvjetom da je udaljena najmanje 300 m od gospodarskih zgrada, vodotokova i jezera i 700 m od ribogojilišta; pri brzini vjetra ispod 3 m/s, relativnoj vlazi iznad 55 %, kada nema inverzije.

Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam

Razvrstan je u III. skupinu otrova.